



57<sup>è</sup>   
Société de Geriatrie  
de l'Ouest et du Centre

Journées  
de FORMATION et de RECHERCHE  
de **GÉRONTOLOGIE**  
de l'Ouest et du Centre

Intervention d'un  
pharmacien clinicien  
aux EMG

*Hélène Riviere*  
*CHU Angers*



- Dr Riviere / Dr Corvaisier
  - Absence de conflit d'intérêt



# Contexe

- 1 personne âgée / 2 hospitalisée après SAU [1]
- Patients âgés sont plus à risque d'événement indésirable médicamenteux au cours de leur hospitalisation [2]
- Pharmacien clinicien hospitalier participe à la réduction de la iatrogénie [3]

1- Passages aux urgences des personnes âgées de 75 ans et plus en Pays de la Loire. Chiffres-clés. *ORS Pays de la Loire, mars 2024*

2- Jennings ELM and al. In-hospital adverse drug reactions in older adults; prevalence, presentation and associated drugs—a systematic review and meta-analysis. *Age Ageing*

3- Gray SL and al. Systematic Review and Meta-analysis of Interventions to Reduce Adverse Drug Reactions in Older Adults: An Update. *Drugs Aging*. 2023 Nov



## Matériel et Méthode

- Etude observationnelle, rétrospective, monocentrique
- Du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 2025
- Le pharmacien clinicien intervenait pour un bilan de médication lors des interventions de l'EMG au SAU + EMFE Angers Loire Métropole
- **Objectif : Evaluer l'impact d'un pharmacien clinicien au sein des EMG du CHU d'Angers en 2025**



## Résultats

- n = 82 patients ayant bénéficié intervention pharmaceutique
- Femme 62,2%
- Moyenne âge 87,3 ans
- EMG : 39%
- EMFE : 61%




## Résultats

- Moyenne de 2,3 interventions pharmaceutiques par patient
- 76,8% des patients ont pu bénéficier d'au moins une intervention pharmaceutique
- 53,7 % des patients au moins 2 interventions pharmaceutiques
- 14,6 % plus de 4 interventions




## Intervention pharmaceutique par classes médicamenteuses






## Type d'intervention pharmaceutique





## Type d'intervention pharmaceutique par classes médicamenteuses


■ Antalgique ■ Anti-HTA ■ Antidépresseur ■ BDZ & co ■ IPP





# Type d'intervention pharmaceutique par classes médicamenteuses


■ Antalgique ■ Anti-HTA ■ Antidépresseur ■ BDZ & co ■ IPP





# Type d'intervention pharmaceutique par classes médicamenteuses


■ Antalgique ■ Anti-HTA ■ Antidépresseur ■ BDZ & co ■ IPP





# Type d'intervention pharmaceutique par classes médicamenteuses


■ Antalgique ■ Anti-HTA ■ Antidépresseur ■ BDZ & co ■ IPP





# Type d'intervention pharmaceutique par classes médicamenteuses

■ Antalgique ■ Anti-HTA ■ Antidépresseur ■ BDZ & co ■ IPP





## Discussion

- La démarche pluridisciplinaire entre équipe mobile de gériatrie et le pharmacien clinicien a permis d'enrichir les interventions et les préconisations médicamenteuses afin de diminuer les événements iatrogènes potentielles des patients évalués.



Merci de votre attention

