



Évaluez vous systématiquement
l'acceptabilité ou les réticences à la
vaccination chez les personnes âgées
que vous prenez en charge ?



57^è
Société de Gerontologie
de l'Ouest et du Centre

Journées
de FORMATION et de RECHERCHE
de **GÉRONTOLOGIE**
de l'Ouest et du Centre

**L'hésitation vaccinale
Comprendre les raisons et y
répondre**

**Enquête PUGG sur les motivations à
accepter ou refuser la vaccination contre
la COVID-19 en EHPAD et en USLD**

Pr Cédric Annweiler




Liens d'intérêt avec le sujet de la présentation

- Symposium GSK « Vacciner : ne pas oublier ! » Juin 2026




Contexte : Pandémie COVID-19

Situation by WHO Region




Source: World Health Organization
Data may be incomplete for the current day or week.



5 millions de décès attribués à la COVID-19
Bilan réel x 2-4




Contexte : Surmortalité en 2020 en fonction de l'âge





Contexte : Association à l'âge





Intérêt de la vaccination chez la personne âgée !



Mauricette M., 78 ans, première personne vaccinée contre le Covid-19 en France, le 27 décembre 2020 à l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis). (THOMAS SAMSON / AFP)



Efficacité vaccinale Phase 3 Pfizer vaccine*

Table 3. Vaccine Efficacy Overall and by Subgroup in Participants without Evidence of Infection before 7 Days after Dose 2.

Efficacy End-Point Subgroup	BNT162b2 (N=18,198)		Placebo (N=18,325)		Vaccine Efficacy, % (95% CI)†
	No. of Cases	Surveillance Time (No. at Risk)*	No. of Cases	Surveillance Time (No. at Risk)*	
Overall	8	2.214 (17,411)	162	2.222 (17,511)	95.0 (90.0–97.9)
Age group					
16 to 55 yr	5	1.234 (9,897)	114	1.239 (9,955)	95.6 (89.4–98.6)
>55 yr	3	0.980 (7,500)	48	0.983 (7,543)	93.7 (80.6–98.8)
≥65 yr	1	0.508 (3,848)	19	0.511 (3,880)	94.7 (66.7–99.9)
≥75 yr	0	0.102 (774)	5	0.106 (785)	100.0 (–13.1–100.0)

Efficacy End-Point Subgroup	BNT162b2, 30 µg (N=21,669)		Placebo (N=21,686)		VE (95% CI)
	No. of participants	Surveillance time person-yr (no. at risk)	No. of participants	Surveillance time person-yr (no. at risk)	
Covid-19 occurrence					
After dose 1	50	4.015 (21,314)	275	3.982 (21,258)	82.0 (75.6–86.9)
After dose 1 to before dose 2	39		82		52.4 (29.5–68.4)
Dose 2 to 7 days after dose 2	2		21		90.5 (61.0–98.9)
≥7 Days after dose 2	9		172		94.8 (89.8–97.6)


Tolérance :

- Intensité **légère à modérée** des réactions locales (douleur)
- Effets systémiques fréquents rapportés : Fatigue; céphalées
- **Faible incidence** des événements indésirables graves
- Taux d'événements graves **similaire entre les groupes vaccin et placebo**



Couverture vaccinale

Proportion de la population ayant reçu une dose :






Couverture vaccinale

Évolution de la couverture vaccinale

Pourcentage de personnes ayant reçu une dose au 16 août 2021



Sources : Covid-Tracker, ministère de la Santé - Infographie DDM PhR



Étude VACCOVID-SENIORS Objectifs

- **Objectif principal :**

- Comprendre les mécanismes d'acceptation ou de refus du vaccin contre la COVID19 chez les personnes résidant en EHPAD et USLD

- **Objectifs secondaires :**

- Evaluer le taux d'acceptation du vaccin contre la COVID19 chez les personnes résidant en EHPAD et USLD,
- Dresser un état des lieux à grande échelle des symptômes observés suite à la vaccination,
- Dresser un état des lieux des organisations territoriales locales innovantes en matière de vaccination et éventuellement répliquables à l'échelle de la nation



Étude VACCOVID-SENIORS Matériels et méthodes

Etude transversale nationale conduite par la SFGG

- début des inclusions : 2 juin 2021
- arrêt des inclusions : 30 septembre 2021

Questionnaire standardisé Google form

- Membres de la SFGG dont médecins co
- Sociétés savantes régionales et filiales (dont la SGOC évidemment !)
- MCOOR et FFamco

Autorisations réglementaires

- Comité d'éthique du CHU d'Angers : 2021-028
- Enregistrement CNIL : n° ar21-0004v0
- ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04779541



Étude VACCOVID-SENIORS Matériels et méthodes

Rubrique 1 sur 58

Enquête PUGG 2021: Motivations à se faire vacciner contre le COVID-19 en EHPAD et USLD

La mise à disposition de vaccins contre le virus SARS-CoV-2 en décembre 2020 a profondément modifié la gestion de la pandémie COVID-19.

Compte-tenu de la défiance traditionnellement forte en France à l'égard de la vaccination et afin d'optimiser les prochaines campagnes de vaccination, la SFGG porte une enquête nationale flash visant à évaluer le taux d'acceptation du vaccin chez les personnes résidant en EHPAD et USLD (premières ciblées par la campagne de vaccination) et à en comprendre les mécanismes d'acceptation ou au contraire de refus. Nous dressons également un bref état des lieux des organisations territoriales locales innovantes et éventuellement répliquables à l'échelle de la nation.

Consignes :

Merci de compléter 5 fiches si possible, 1 par résident (représentatifs de votre établissement - 2 résidents en EHPAD ou USLD de 75 ans et plus ayant accepté la vaccination, et 3 l'ayant refusée). Si vous avez moins de 3 (voire aucun) résident non vacciné, veuillez tout de même soumettre un questionnaire pour 2 résidents vaccinés.

Merci du temps que vous consacrerez à cette enquête et d'y répondre en nombre.
Les résultats seront présentés lors des 41^e Journées Annuelles de la SFGG.

Amicalement,

Nathalie Salles, Cédric Annweiler et Guillaume Sacco



Étude VACCOVID-SENIORS Matériels et méthodes

Caractéristiques des répondants et EHPAD

- Concernant les répondants : identification et fonction
- Concernant les EHPAD : nb résidents et nb vaccinés, antécédent(s) cluster(s)

Caractéristiques des résidents (2 vaccinés, 3 non vaccinés représentatifs)

- Démographiques (sexe, âge, étude, profession, GIR, antécédents...)
- Niveau de compréhension de la COVID19 et du vaccin
- Prise habituelle de vitamine D et vaccination contre la grippe
- COVID19
 - Contact antérieur
 - Vaccinés : information/réalisation/effets secondaires vaccination
 - Non vaccinés : information et motif(s) de refus

Initiatives territoriales originales pour faciliter la vaccination des personnes en perte d'autonomie



Étude VACCOVID-SENIORS Résultats

Répondants : n=101

- 68 médecins co et médecins d'USLD
- 24 soignants (IDE/IDEC/cadre santé)
- 7 directeurs d'établissement
- 1 psychologue
- 1 pharmacien

Couverture vaccinale 90,6%

EHPAD/USLD : n=89/12

- **10152 résidents au total** (1 établissement manquant)
- **9201 vaccinés au total** (3 établissements manquants)
- 75% des établissements ont eu au moins un cluster COVID19

Tableau 1. Comparaisons des caractéristiques des participants ayant accepté la vaccination contre la COVID19 et de ceux l'ayant refusée (n=323)

	Total (n=323)	Ayant accepté la vaccination antiCOVID-19		
		Non (n=144)	Oui (n=179)	P
Données démographiques				
Âge, moy±ET	88.6±6.5	88.3±6.8	88.8±6.3	0.599
Sexe féminin	223(69.0)	112(77.8)	111(62.0)	0.002
Lieu de vie EHPAD (versus USLD)	288(89.2)	124(86.1)	164(91.6)	0.113
Niveau d'étude ≥ Secondaire (n=60 missing)	122(46.4)	47(42.3)	75(49.3)	0.261
Dernière profession connue (n=49 missing)				0.080
Agriculteur	29(9.0)	7(4.9)	22(12.3)	
Artisan	18(5.6)	6(4.2)	12(6.7)	
Commerçant et chef d'entreprise	16(5.0)	8(5.6)	8(4.5)	
Cadres et professions intellectuelles sup.	33(10.2)	9(6.3)	24(13.4)	
Professions intermédiaires	38(11.8)	18(12.5)	20(11.2)	
Employé	59(18.3)	31(21.5)	28(15.6)	
Ouvrier	39(12.1)	20(13.9)	19(10.6)	
Femme au foyer	11(3.4)	6(4.2)	5(2.8)	
Autre	49(15.2)	27(18.8)	22(12.3)	
Score GIR ≥ 3 (n=5 missing)	167(52.5)	61(43.3)	106(59.9)	0.003
Marié ou en concubinage (versus célibataires, divorcés, veufs)	39(12.1)	11(7.6)	28(15.6)	0.028
Aidant principal non professionnel				0.267
Aucun	55(17.0)	23(16.0)	32(17.9)	
Conjoint(e)	20(6.2)	5(3.5)	15(8.4)	
Enfant	187(57.9)	86(59.7)	101(59.4)	
Autres	61(18.9)	30(20.8)	31(17.3)	

99% Pfizer
0,5% Moderna
0,5% AstraZeneca

Tableau 1. Comparaisons des caractéristiques des participants ayant accepté la vaccination contre la COVID19 et de ceux l'ayant refusée (n=323)

	Total (n=323)	Ayant accepté la vaccination antiCOVID19		P-value*
		Non (n=144)	Oui (n=179)	
Données démographiques				
Âge, moy±ET	88.6±6.5	88.3±6.8	88.8±6.3	0.599
Sexe féminin	223(69.0)	112(77.8)	111(62.0)	0.002
Lieu de vie EHPAD (versus USLD)	288(89.2)	124(86.1)	164(91.6)	0.113
Niveau d'étude ≥ Secondaire (n=60 missing)	122(46.4)	47(42.3)	75(49.3)	0.261
Dernière profession connue (n=49 missing)				0.080
Agriculteur	29(9.0)	7(4.9)	22(12.3)	
Artisan	18(5.6)	6(4.2)	12(6.7)	
Commerçant et chef d'entreprise	16(5.0)	8(5.6)	8(4.5)	
Cadres et professions intellectuelles sup.	33(10.2)	9(6.3)	24(13.4)	
Professions intermédiaires	38(11.8)	18(12.5)	20(11.2)	
Employé	59(18.3)	31(21.5)	28(15.6)	
Ouvrier	39(12.1)	20(13.9)	19(10.6)	
Femme au foyer	11(3.4)	6(4.2)	5(2.8)	
Autre	49(15.2)	27(18.8)	22(12.3)	
Score GIR > 3 (n=5 missing)	167(52.5)	61(43.3)	106(59.9)	0.003
Marié ou en concubinage, versus célibataires, divorcés, veufs)	39(12.1)	11(7.6)	28(15.6)	0.028
Aidant principal non professionnel				0.267
Aucun	55(17.0)	23(16.0)	32(17.9)	
Conjoint(e)	20(6.2)	5(3.5)	15(8.4)	
Enfant	187(57.9)	86(59.7)	101(59.4)	
Autres	61(18.9)	30(20.8)	31(17.3)	

Tableau 1. Comparaisons des caractéristiques des participants ayant accepté la vaccination contre la COVID19 et de ceux l'ayant refusée (n=323)

	Total (n=323)	Ayant accepté la vaccination antiCOVID19		P-value*
		Non (n=144)	Oui (n=179)	
Antécédents				
Trouble neurocognitif majeur	149(46.1)	74(51.4)	75(41.9)	0.089
Hypertension artérielle	214(66.3)	94(65.3)	120(67.0)	0.739
Diabète	62(16.2)	29(20.1)	33(18.4)	0.699
Asthme/BPCO	39(12.1)	15(10.4)	24(13.4)	0.412
Cardiopathie	144(44.6)	63(43.8)	81(45.3)	0.787
Insuffisance rénale sévère	36(11.2)	16(11.1)	20(11.2)	0.986
Cancer/hémopathie	31(9.6)	13(9.0)	18(10.1)	0.755
Dénutrition	100(31.0)	47(32.6)	53(29.6)	0.558
Obésité	31(9.6)	18(12.5)	13(7.3)	0.112
Cirrhose	3(0.9)	1(0.7)	2(1.1)	1.000
Chute dans les 6 derniers mois	100(31.0)	33(22.9)	67(37.4)	0.005
Allergie grave	8(2.5)	7(4.9)	1(0.6)	0.024
Autonomie				
Capable à comprendre l'information donnée sur la COVID-19 et ses formes graves	211(65.3)	86(59.7)	125(69.8)	0.058
Capable à comprendre l'information donnée sur le vaccin, son efficacité et ses effets indésirables connus	198(61.3)	82(56.9)	116(64.8)	0.149

Tableau 1. Comparaisons des caractéristiques des participants ayant accepté la vaccination contre la COVID19 et de ceux l'ayant refusée (n=323)

	Total (n=323)	Ayant accepté la vaccination antiCOVID19		P-value*
		Non (n=144)	Oui (n=179)	
Traitements				
Polymédication modérée ou sévère	254(78.6)	104(72.2)	150(83.8)	0.012
Supplémentation en vitamine D	211(65.3)	92(63.9)	119(66.5)	0.627
Antécédents de COVID-19				
Infection par le SARS-CoV-2 diagnostiquée il y a plus de 3 mois	94(29.1)	45(31.3)	49(27.4)	0.446
Immunisé(e) contre le SARS-CoV-2 (n=201 missing ou Ne Sait Pas)	20(16.4)	8(17.4)	12(15.8)	0.817
Antécédents de COVID-19 dans l'entourage familial et/ou amical (n=115 missing ou Ne Sait Pas)	66(31.7)	35(39.3)	31(26.1)	0.042
Vaccination contre la grippe				
Habituellement vacciné contre la grippe chaque hiver	249(77.1)	78(54.2)	171(95.5)	<0.001
vacciné contre la grippe cette année	226(70.0)	73(50.7)	153(85.5)	<0.001

Tableau 1. Comparaisons des caractéristiques des participants ayant accepté la vaccination contre la COVID19 et de ceux l'ayant refusée (n=323)

	Total (n=323)	Ayant accepté la vaccination antiCOVID19		P-value*
		Non (n=144)	Oui (n=179)	
Information sur la vaccination contre la COVID-19				
Le résident a été informé	254(78.6)	105(72.9)	149(83.2)	0.024
Le proche a été informé	204(63.2)	93(64.6)	111(62.0)	0.634
Origine des explications fournies au patient				
Explication du médecin traitant	164(50.8)	72(50.0)	92(51.4)	0.803
Explication du médecin coordonnateur	192(59.4)	88(61.1)	104(58.1)	0.584
Explication du médecin d'USLD	36(11.2)	19(13.2)	17(9.5)	0.294
Explication d'une équipe mobile de gériatrie	3(0.9)	3(2.1)	0(0.0)	0.088
Explication d'une infirmière	146(45.2)	62(43.1)	84(46.9)	0.487
Explication venant d'une autre source	47(14.6)	20(13.9)	27(15.1)	0.762
Autres sources d'informations				
Télévision	222(68.7)	99(68.8)	123(68.7)	0.995
Radio	79(24.5)	39(27.1)	40(22.4)	0.325
Internet/Réseaux sociaux	27(8.4)	18(12.5)	9(5.0)	0.016
Proches	134(41.5)	52(36.1)	82(45.8)	0.079
Autres	74(22.9)	30(20.8)	44(24.6)	0.426
Contexte dans lequel les informations ont été données et le vaccin réalisé				0.168
Dans un bureau de consultation	52(16.1)	17(11.8)	35(19.6)	
Dans la chambre du résident	208(64.4)	97(67.4)	111(62.0)	
Autres	63(19.5)	30(20.8)	33(18.4)	
Choix du vaccin laissé au résident	10(3.1)	4(2.8)	6(3.4)	1.000

Tableau 2. Modèles de régressions logistiques univariées examinant l'association entre l'acceptation de la vaccination contre la COVID19 (variable dépendante) et les caractéristiques des participants (n=323)

	Modèles univariés		
	OR	[IC à 95%]	P-value*
Données démographiques			
Âge	1.01	[0.98-1.05]	0.475
Sexe féminin	0.47	[0.28-0.77]	0.003
Lieu de vie EHPAD (versus USLD)	1.76	[0.87-3.58]	0.117
Niveau d'étude ≥ Secondaire (n=60 missing)	1.33	[0.81-2.17]	0.261
GIR ≥ 3 (n=5 missing)	1.96	[1.25-3.07]	0.003
Marié(e) ou en concubinage (versus célibataires, divorcés, veufs)	2.24	[1.08-4.68]	0.031
Antécédents			
Trouble neurocognitif majeur	0.68	[0.44-1.06]	0.090
Hypertension artérielle	1.08	[0.68-1.72]	0.739
Diabète	0.90	[0.51-1.56]	0.698
Asthme/BPCO	1.33	[0.67-2.64]	0.413
Cardiopathie	1.06	[0.68-1.65]	0.787
Insuffisance rénale sévère	1.01	[0.50-2.02]	0.986
Cancer/hémopathie	1.13	[0.53-2.38]	0.755
Dénutrition	0.89	[0.54-1.39]	0.558
Obésité	0.55	[0.26-1.16]	0.116
Cirrhose	1.62	[0.15-18.0]	0.697
Chute dans les 6 derniers mois	2.01	[1.23-3.29]	0.005
Allergie grave	0.11	[0.01-0.91]	0.040

Tableau 2. Modèles de régressions logistiques univariées examinant l'association entre l'acceptation de la vaccination contre la COVID19 (variable dépendante) et les caractéristiques des participants (n=323)


	Modèles univariés		
Autonomie	OR	[IC à 95%]	P-value*
Capable de comprendre l'information donnée sur la COVID-19 et ses formes graves	1.56	[0.98-2.48]	0.058
Capable de comprendre l'information donnée sur le vaccin, son efficacité et ses effets indésirables connus	1.39	[0.89-2.18]	0.150
Traitements			
Polymédication modérée ou sévère	1.99	[1.16-3.41]	0.013
Supplémentation en vitamine D	1.12	[0.71-1.78]	0.627
Antécédents de COVID-19			
Infection par le SARS-CoV-2 diagnostiquée il y a plus de 3 mois	0.83	[0.51-1.34]	0.446
Immunisé(e) contre le SARS-CoV-2 (n=201 missing ou Ne Sait Pas)	0.89	[0.33-2.37]	0.817
Antécédents de COVID-19 dans l'entourage familial et/ou amical (n=115 missing ou Ne sais pas)	0.54	[0.30-0.98]	0.043
Vaccination contre la grippe			
Habituellement vacciné contre la grippe chaque hiver	18.09	[8.28-39.50]	<0.001
Vacciné contre la grippe cette année	5.72	[3.37-9.71]	<0.001

Tableau 2. Modèles de régressions logistiques univariées examinant l'association entre l'acceptation de la vaccination contre la COVID19 (variable dépendante) et les caractéristiques des participants (n=323)

	Modèles univariés		
	OR	[IC à 95%]	P-value*
Information sur la vaccination contre la COVID-19			
Le résident a été informé	1.85	[1.08-3.16]	0.026
Le proche a été informé	0.90	[0.57-1.41]	0.634
Origine des explications fournies au patient			
Explication du médecin traitant	1.06	[0.68-1.64]	0.803
Explication du médecin coordonnateur	0.88	[0.56-1.38]	0.584
Explication du médecin d'USLD	0.69	[0.35-1.38]	0.296
Explication d'une infirmière	1.17	[0.75-1.82]	0.487
Explication venant d'une autre source	1.10	[0.59-2.06]	0.763
Autres sources d'informations			
Télévision	1.00	[0.62-1.60]	0.995
Radio	0.78	[0.47-1.29]	0.326
Internet/Réseaux sociaux	0.37	[0.16-0.85]	0.020
Proches	1.50	[0.95-2.35]	0.079
Autres	1.24	[0.73-2.10]	0.426
Choix du vaccin laissé au résident	1.21	[0.34-4.39]	0.768

Tableau 3. Modèles de régression logistique multivariée examinant l'association entre l'acceptation de la vaccination contre la COVID19 (variable dépendante) et les caractéristiques des participants (n=323)

	Modèle multivarié			Modèles multivarié Méthode Backward		
	OR	[IC à 95%]	P-value*	OR	[IC à 95%]	P-value*
Sexe féminin	0.68	[0.35-1.30]	0.243	-	-	-
Lieu de vie EHPAD (versus USLD)	2.54	[1.02-6.32]	0.045	-	-	-
Score GIR ≥ 3	2.36	[1.18-4.72]	0.015	2.99	[1.72-5.22]	<0.001
Marlé ou en concubinage (versus célibataires, divorcés, veufs)	3.99	[1.38-11.58]	0.011	4.13	[1.56-10.92]	0.004
Trouble neurocognitif majeur	0.50	[0.21-1.16]	0.106	-	-	-
Obésité	0.62	[0.24-1.64]	0.337	-	-	-
Chute dans les 6 derniers mois	1.81	[0.95-3.44]	0.070	-	-	-
Allergie grave	0.14	[0.01-1.38]	0.092	-	-	-
Capable de comprendre l'information donnée sur la COVID-19	1.04	[0.21-5.16]	0.959	-	-	-
Capable de comprendre l'information donnée sur le vaccin	0.48	[0.11-2.13]	0.333	-	-	-
Polymédication modérée ou sévère	1.07	[0.52-2.21]	0.846	-	-	-
Habituellement vacciné contre la grippe chaque hiver	29.24	[8.69-98.33]	<0.001	29.43	[12.11-71.53]	<0.001
Vacciné contre la grippe cette année	0.99	[0.40-2.46]	0.990	-	-	-
Le résident a été informé	1.99	[0.79-5.01]	0.143	-	-	-
Information via Internet/Réseaux sociaux	0.30	[0.11-0.82]	0.019	0.34	[0.13-0.88]	0.026
Information par les proches	1.39	[0.77-2.49]	0.272	-	-	-



Probabilité d'accepter la vaccination contre le COVID19 (RR [95CI])	0.1 [0.01-0.2]	0.3 [0.2-0.6]	0.7 [0.5-0.9]	1 (reference)
	1 (reference)	5.2 [1.1-24.1]	11.8 [3.0-46.7]	17.5 [4.5-68.0]

Figure 1. Arbre de classification prédisant l'acceptation de la vaccination contre la COVID19 chez les résidents (N=323).

Pour chaque noeud: numéro de noeud; N de résidents dans le noeud; proportion des résidents ayant accepté la vaccination contre la COVID19 dans le noeud (N ayant accepté / N noeud). RR: risqué relatif ; 95CI: intervalle de confiance à 95%.




Figure 2. Motifs de refus de la vaccination (n=144)

8% contre-indication définitive ou temporaire
10% divers (état trop fragile, pas capable de décider)
83% refus par conviction personnelle ou défiance des proches




Figure 3. Raisons en cas de refus par conviction personnelle (n=75)

Environ 30% de refus par peur du(des) vaccin(s)
Environ 20% de défiance à l'égard de la science/industrie/autorités
Environ 20% jugeant le bénéfice/risque défavorable

Tableau 4. Effets indésirables du vaccin (n=179)

	Total (n=179)
Résidents ayant eu au moins 1 effet indésirable	6 (3.4%)
Asthénie	3 (1.7%)
Douleur ou rougeur au point d'injection	4 (2.2%)
Myalgies/courbatures	1 (0.6%)
Maux de tête	1 (0.6%)
Fièvre	1 (0.6%)
Autres	1 (0.6%)
Décès	0

Remontée de dispositifs particuliers/innovants visant à accompagner la campagne vaccinale auprès des personnes âgées sur le territoire

Seulement 8 réponses

- **Vaccination des familles et soignants au sein des EHPAD**
- **Equipe mobile de vaccination territoriale**
- **Appel des « listes canicule » par les mairies**
- **Centres de vaccination dédiés aux personnes âgées**



Étude VACCOVID-SENIORS Discussion

- Les motivations à accepter ou refuser la vaccination contre la COVID19 chez les résidents en EHPAD/USLD semblent relever avant tout de :
 - **conviction personnelle** vis-à-vis des vaccins
 - **état de fragilité**
 - **capacité à comprendre** et prendre des décisions en autonomie




Étude VACCOVID-SENIORS Discussion

- Les motivations à accepter ou refuser la vaccination contre la COVID19 chez les résidents en EHPAD/USLD semblent relever avant tout de :
 - **conviction personnelle** vis-à-vis des vaccins
 - **état de fragilité**
 - **capacité à comprendre** et prendre des décisions en autonomie
- Cela justifie des **efforts répétés d'écoute et d'explications** aux personnes âgées, à leurs proches et aux équipes de soins car :
 - les plus fragiles déclinent régulièrement l'offre vaccinale
 - beaucoup pensent encore que le rapport bénéfice-risque du vaccin est défavorable
 - contrepied des réseaux sociaux



Propositions pratiques





MERCI DE VOTRE ATTENTION



Capture écran, spot publicitaire du Ministère des Solidarités et de la Santé



Vous sentez-vous suffisamment à jour sur les recommandations vaccinales du sujet âgé ?



Vérifiez-vous systématiquement le statut vaccinal
des personnes âgées que vous prenez en charge ?



Des questions?