



# SYNDROME DE LA TOUR DE PISE INDUIT PAR LE VALPROMIDE



faculté de  
**Médecine et**  
de **Pharmacie**

Université de  
**POITIERS**



Evelyne LIUU, Céline BAUDEMONT, Fabienne BELLARBRE,  
Isabelle MERLET-CHICOINE, Marc PACCALIN

Service de Gériatrie, CHU La Milétrie, 86000 POITIERS



# CAS CLINIQUE

- 73 ans
- Maladie d'Alzheimer à composante frontale
- Médication :
  - Mémantine 10 mg
  - Galantamine LP 24 mg
  - Mirtazapine 30 mg
- Troubles du comportement



Valpromide 300 mg

**SYNDROME  
DE LA TOUR  
DE PISE**



# PHYSIOPATHOLOGIE

DOPAMINE

ACETYLCHOLINE



AUTRES NEUROTRANSMETTEURS ?

## FACTEURS PREDISPOSANTS

Sexe féminin

Sujet âgé

Maladie neuro-dégénérative  
sous-jacente

Exposition Psychotropes

# IATROGENIE



Neuroleptiques

Antipsychotiques

IRS


Benzodiazépines

Anti-cholestérasiques


Anti-émétiques

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

# INTERACTIONS CYP



# INTERACTIONS CYP



# TRAITEMENT

Arrêt du traitement incriminé

CLOZAPINE



**POLYPATHOLOGIE**  
**POLYMEDICATION**





**Merci  
pour votre  
attention**

